

С. А. Цырульников

Научный руководитель

Т. Н. Бессонова

*Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации
г. Гомель, Республика Беларусь*

СМЕРТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Динамика показателей смертности за предыдущее столетие неоднократно существенно изменялась. В первой половине XX в. все показатели смертности имели тенденцию к снижению, быстро росла продолжительность жизни. Так в 1973–1974 гг. ожидаемая продолжительность жизни составляла 73 года против 53 лет в 1926 г. Затем эти показатели перестали расти и начали снижаться вплоть до 2005 г. Начиная с 2005 г. наблюдается небольшой рост этих показателей, хотя на момент 2011 г. они все еще меньше максимальных показателей XX в.

Коэффициент смертности населения уменьшился с 14,3% (в 2011 г.) до 13,4% в 2012 г. При этом стоит отметить, что за 2000–2012 гг. в сельской местности смертность зарегистрирована примерно в 2 раза выше, чем в городской местности. Вместе с тем в 2012 г. каждый пятый из всех умерших – это лица в трудоспособном возрасте, при этом более 80% из них – мужчины. Своего минимального значения смертность достигла в 1960 г. (6,6 промилле). Начиная с 1950 г., максимальный коэффициент смертности был зафиксирован в 2002 г. (14,9 промилле).

Младенческая смертность в целом имеет тенденцию к снижению. Если сравнивать уровни 2000 и 2012 гг., то можно заметить снижение данного показателя в 2,1 раза. Такое же движение наблюдается и в статистике детской смертности в возрасте до 5 лет. В 1990 г. данный показатель был на уровне в 2247 смертей, то уже в 2011 г. он составил 549 чел.

Анализируя статистику причин смерти в Беларуси за 2005–2011 гг., можно выделить следующие наиболее частые причины смертей:

- На первом месте стоят болезни системы кровообращения (52%).
- Значительная доля смертей приходится на новообразования (13%).
- Внешние причины смертности (около 11%).

Проанализировав данные по смертности от убийств за 1990–2011 гг., можно сказать, что женщины умирали в 2–3 раза реже от убийств, чем мужчины. Причем в 1995 г. можно заметить значительный рост смертности по сравнению с 1990 г. Однако, уже с 2009 г. он становится ниже отметки 1990 г. как у мужчин, так и у женщин.

Как и в случае с убийствами смертность от самоубийств выше у мужчин, но если количество убийств мужчин и женщин отличается в 2–3 раза, то количество самоубийств мужчин больше в 4–6 раз, чем у женщин.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в последние годы сложилась тенденция спада уровня смертности, но ее уровень еще достаточно высокий. Для обеспечения демографической безопасности нужно особое внимание уделять причинам смертности детей, матерей и всего населения репродуктивного возраста, так как именно они являются гарантами демографической безопасности.